



ASAFIN AUXILIADOR DO PROCESSO GASTRINTestinal

Em geral, as especiarias têm sido consideradas para fortalecer o fluxo salivar e a secreção de suco gástrico e auxiliar na digestão. A ação estimulante digestiva das especiarias se dá através da estimulação das atividades enzimáticas que participam da digestão.

Asafin® é um novo ingrediente e nutracêutico baseado em um condimento Indiano, listado no GRAS (Generally Recognized as Safe – Reconhecido como Seguro) aprovado pela EFSA (European Food Safety Authority). O ingrediente é 100% natural.

BENEFÍCIOS

- Redução dos desconfortos gastrointestinais.
- Melhora na produção de enzimas gástricas.
- Melhora na digestão de alimentos gordurosos.
- Redução da saciedade precoce.
- Redução do inchaço da região gástrica.
- Redução da plenitude pós-prandial

INDICAÇÕES

- Auxiliar na digestão.
- Coadjuvante no uso de probióticos.
- Controle de quadros de úlcera gástrica.

COMO AGE?

- Estimulação Salivar e Enzimática: Aumenta a secreção salivar e ativa a enzima digestiva amilase contida na saliva, melhorando os processos digestivos.
- Fluxo Biliar: Estimula o fluxo biliar ao aumentar a secreção de ácidos biliares.
- Enzimas Pancreáticas e Intestinais: Aumenta a atividade de enzimas digestivas no pâncreas, como a lipase pancreática, e no intestino delgado, desempenhando um papel importante na digestão de lipídios (gorduras).
- Modulação Estomacal/Intestinal: Apresenta modulação nos baixos níveis de ácido no estômago, na pressão estomacal e na flatulência, promovendo a regulação dos movimentos intestinais

SUGESTÃO DE FÓRMULAS:

Componentes	Concentração
Asafin®	250 mg
Magnésio quelado	100 mg
Vitamina B3	7 mg

Posologia: Tomar 1 dose antes do café da manhã e jantar.

Componentes	Concentração
Asafin®	250 mg
Vitamina B3	7 mg
Vitamina B6	7 mg
Vitamina B9	1 mg

Posologia: Tomar 1 dose antes do café da manhã e jantar.

POSOLOGIA

dose é de 250 mg, a ser tomada 1 ou 2 vezes ao dia (antes do café da manhã e do jantar).

ESTUDO CLÍNICO

- Participantes: 43 indivíduos (homens e mulheres), com idades entre 25-60 anos, diagnosticados com desconfortos moderados a graves de sintomas digestivos. Tratamento: Os indivíduos receberam placebo (n=22) ou a formulação Asafin® (n=21) na dose de 2x250 mg (antes do café da manhã e jantar) por 30 dias.
- Resultado Principal: Foi observada uma redução significativa de 51,6% na pontuação geral de gravidade dos sintomas quando as pontuações GSRS do grupo Asafin® foram comparadas ao grupo placebo. Além disso, o estudo avaliou o Escore de Gravidade da Dispepsia de Glasgow (GDSS) e o Formulário Resumido do Índice de Dispepsia Nepeana (NDI-SF).

