



VinOgrape

**AUMENTA A SACIEDADE ENQUANTO CUIDA
DO SEU INTESTINO**

VinOgrape™ é um extrato natural de uva, padronizado em no mínimo 90% de polifenóis totais, 18% de procianidinas oligoméricas e 2% de antocianinas totais. Foi desenvolvido através de um processo exclusivo, que garante sua eficácia e seu efeito prebiótico-like de excelência. Isso é um diferencial.

BENEFÍCIOS

- Polifenóis com ação Prebiótico-like;
- Favorece o aumento de Akkermansia muciniphila;
- Modula a produção de GLP-1, auxiliando no aumento da saciedade;
- Modula neuro-hormônios, como a grelina e leptina, favorecendo a saciedade;
- Colabora para a melhora da sensibilidade à insulina;
- Modula positivamente a microbiota do intestino;
- Auxilia na melhora da função de barreira intestinal;
- Colabora para a diminuição da inflamação intestinal;

INDICAÇÕES:

- Pacientes que necessitam melhorar a saúde intestinal e aumentar a saciedade, auxiliando no gerenciamento do peso.

COMO AGE?



POSOLOGIA:

600mg ao dia, após o café da manhã.

SUGESTÃO DE FÓRMULAS:

Saciedade e Diminuição da Retenção de Líquidos

Vinogrape™ Plus 600mg
Administrar 1 dose ao dia.

ASSOCIAR COM:

CactiN™ 500mg
Administrar 1 dose ao dia.

Múltiplas Ações no Gerenciamento do Peso

Vinogrape™ Plus 600mg
Administrar uma dose ao dia pela manhã.

ASSOCIAR COM:

Morosil™ 400mg
Picolinato de Cromo 100mcg
Administrar uma dose, pela manhã.

Bem-Estar e Redução da Fadiga

Vinogrape™ Plus 600mg
Administrar 1 dose ao dia.

ASSOCIAR COM:

RiaGev™ 500mg
Administrar 1 dose ao dia.

Saciedade e Gerenciamento do Peso

Vinogrape™ Plus 600mg
Administrar 1 dose ao dia.

Aumento da Saciedade e Redução da Compulsão

Vinogrape™ Plus 600mg
Administrar 1 dose ao dia.

ASSOCIAR COM:

Saffrin® 90mg
Administrar 1 a 2 doses ao dia.

Bem-Estar e Redução da Fadiga

Vinogrape™ Plus 600mg
Administrar 1 dose ao dia.

ASSOCIAR COM:

RiaGev™ 500mg
Administrar 1 dose ao dia.

ESTUDO CLÍNICO

O estudo in vivo de Vinogrape™ sobre a modulação da microbiota intestinal e proteção contra a colite foi realizado em camundongos, que foram divididos em três grupos: suplementação com 600 mg de Vinogrape™ e indução de colite, um grupo sem suplementação com indução de colite (controle positivo) e camundongos saudáveis (controle negativo).

O estudo teve 5 semanas de duração, com 4 semanas de administração oral seguida de 1 semana de indução de colite.

