



# MERATRIM®

**EMAGRECIMENTO COMPROVADO, TRANSFORMAÇÃO REAL.**

## O QUE É?

Meratrim® é um blend natural patenteado composto por extratos padronizados em 7-hidroxifrullanolídeo e α-mangostin, desenvolvido para auxiliar no emagrecimento, redução de medidas e melhora do metabolismo lipídico.

## BENEFÍCIOS

- Emagrecimento
- Redução de medidas
- Melhora metabólica
- Melhora de funções físicas e autoestima
- Ação natural e bem tolerada

## INDICAÇÃO

- Controle de peso
- Redução de medidas (cintura e quadril)
- Aumento da queima de gordura corporal
- Pessoas com sobrepeso ou obesidade leve/moderada
- Suporte metabólico (colesterol, glicemia, triglicérides)

## COMO AGE?

O Meratrim® age reduzindo a formação de novas células de gordura e acelerando a queima da gordura já acumulada. Ele diminui a atividade de proteínas como PPAR $\gamma$ , ADRP e CD36, que são responsáveis pelo crescimento dos adipócitos e pela entrada de ácidos graxos nas células, o que dificulta o acúmulo de gordura. Ao mesmo tempo, aumenta os níveis de adiponectina hormônio que estimula a lipólise e reduz a perilipina, proteína que protege as reservas de gordura. Com isso, o corpo passa a armazenar menos gordura e a queimar mais, favorecendo a perda de peso e a redução de medidas de forma eficiente e natural.

## SUGESTÃO DE FÓRMULAS:

### Fórmula para redução de medidas + aceleração metabólica

Meratrim® ..... 400 mg  
 Caféina Anidra ..... 100 mg  
 Cromo Picolinato ..... 200 mcg

Posologia: 1 cápsula antes do almoço e jantar.

### Fórmula para perda de gordura + manutenção muscular

Meratrim® ..... 400 mg  
 L-Carnitina ..... 500 mg  
 Taurina ..... 300 mg  
 Vitamina B6 ..... 10 mg

Posologia: 1 cápsula 2x ao dia.

## POSOLOGIA SUGERIDA:

400 mg, duas vezes ao dia

Tomar 30 minutos antes do almoço e 30 minutos antes do jantar.

## ESTUDO CLÍNICO

Dois estudos duplo-cegos, randomizados e controlados por placebo avaliaram a eficácia do Meratrim® no emagrecimento e na redução de medidas. Participaram 100 pessoas com IMC entre 30 e 40 kg/m<sup>2</sup>, divididas em dois grupos: um recebeu 400 mg de Meratrim® duas vezes ao dia e o outro recebeu placebo. Todos seguiram uma dieta de 2000 kcal/dia. Dos 100 participantes, 95 completaram o estudo. Ao longo das 8 semanas, analisaram-se peso, IMC, circunferência de cintura e quadril, além de glicemia, lipídios e adiponectina. O grupo que usou Meratrim® apresentou resultados significativamente superiores, com redução média de 5,2 kg no peso, 2,2 kg/m<sup>2</sup> no IMC, 11,9 cm na cintura e 6,3 cm no quadril, comprovando a eficácia do ativo em comparação ao placebo.




Gráfico 1: Diminuição do peso corporal em 2, 4 e 8 semanas, comparando placebo e Meratrim®.




Gráfico 2: Diminuição do IMC em 2, 4 e 8 semanas, comparando placebo e Meratrim®.

