



MOVE™

Diga adeus à dor articular com a tecnologia patenteada de alta biodisponibilidade

O QUE É?

O Move™ é um ingrediente natural, padronizado e patenteado, composto por uma nova formulação de Boswellia serrata. Ele contém no mínimo 20% de AKBA (ácido acetil-11-ceto- β -boswéllico) biodisponível, enriquecido com óleos não voláteis da própria planta, o que aumenta sua absorção em 51,78% em comparação a extratos comuns.

INDICAÇÕES:

- Osteoartrite (OA)
- Inflamação Articular
- Saúde Musculoesquelética

BENEFÍCIOS

- Ação Rápida
- Alta Biodisponibilidade
- Redução da Dor e Rigidez
- Proteção da Cartilagem
- Segurança Gastrointestinal
- Eficácia Comparável a Corticoides
- Certificações de Qualidade

COMO AGE

O Move™ atua como um potente anti-inflamatório natural que foca na redução da dor e na preservação das articulações por meio de múltiplos mecanismos moleculares. Diferente dos anti-inflamatórios comuns, sua ação não ocorre pela inibição da enzima COX-2, o que o isenta de diversas contraindicações e efeitos colaterais típicos dessa classe. O principal diferencial do ativo é a inibição eficaz da enzima 5-lipoxigenase, que está diretamente ligada à síntese de mediadores inflamatórios. Ao bloquear essa via, o Move™ impede a produção de leucotrienos, controlando a inflamação e aliviando os sintomas de forma segura. Além disso, ele atua na inibição do TNF- α , uma importante citocina pró-inflamatória presente na osteoartrite, que é responsável por ativar linfócitos e estimular a liberação de enzimas destrutivas

POSOLOGIA:

Até 100mg ao dia (podendo ser dividido em duas tomadas)

SUGESTÃO DE FÓRMULAS:

Ideal para pacientes que buscam o alívio rápido da dor

Move™..... 100 mg

Posologia: Tomar 1 cápsula ao dia.

Fórmula para Manejo de Rigidez e Flexibilidade

Move™..... 50 mg

Glucosamin..... 500 mg

Condroitina..... 400 mg


Posologia: Tomar 1 cápsula, duas vezes ao dia.

ESTUDO CLÍNICO

Eficácia Precoce: Redução da Dor (30 Dias)

Este gráfico demonstra a rápida ação do Move™ na redução da dor em pacientes com osteoartrite de joelho. A melhora clínica e estatisticamente significativa é registrada em apenas 5 dias de tratamento. **Resultados:** Enquanto o grupo placebo manteve níveis elevados de dor, o grupo Move™ apresentou um declínio acentuado desde a primeira semana.

Parâmetro: Escala Visual de Dor (VAS).



@ farmaciacurante

atendimento@curante.com.br

(61) 3245-1004



Quer saber mais?

Entre no nosso site, e fale com a equipe comercial