



VENOLIN

DIGA ADEUS À SENSÇÃO DE PERNAS PESADAS E CANSADAS.

O QUE É?

O VENOLIN® é um fitoativo de alta performance extraído dos rizomas da planta *Ruscus aculeatus* (Butcher's Broom). Ele possui uma exclusividade tecnológica que combina ruscogenina e neoruscogenina, sendo padronizado em 10% de ruscogenina. É um produto de origem natural, vegano, livre de glúten, alérgenos e organismos geneticamente modificados (Non-GMO).

BENEFÍCIOS

- Melhora estética
- Alívio de sintomas
- Drenagem Linfática

INDICAÇÃO

- Insuficiência venosa crônica (IVC).
- Hemorroidas.
- Suporte no tratamento de linfedema (acúmulo de líquido linfático).

COMO AGE?

O VENOLIN® atua de forma multifatorial para restaurar a eficiência do sistema circulatório, utilizando um processo tecnológico exclusivo que combina ruscogenina e neoruscogenina. Seu principal mecanismo envolve o agonismo dos receptores α -adrenérgicos, o que induz a vasoconstrição, aumenta o tônus vascular e promove o fechamento eficaz das válvulas venosas, combatendo diretamente o refluxo sanguíneo. Além de tonificar as veias, o ativo exerce uma forte proteção estrutural ao inibir a enzima elastase, responsável pela degradação da elastina e do colágeno na matriz extracelular; essa ação preserva a integridade da parede venosa e reduz significativamente a permeabilidade capilar.

SUGESTÃO DE FÓRMULAS:

Foco em Inchaço e Celulite

VENOLIN® 75 mg
Drenow C..... 400 mg

Posologia: 1 dose de manhã e à noite, após as refeições

Tratamento de Insuficiência Venosa Crônica

VENOLIN® 75 mg
Hesperidina..... 200 mg
Vitamina C..... 100 mg

Posologia: 1 dose de manhã e à noite, após as refeições

POSOLOGIA SUGERIDA:

Via Oral: Ingerir uma dose de 75 mg, duas vezes ao dia (manhã e noite), preferencialmente após as refeições.

ESTUDO CLÍNICO

O estudo clínico de Aguilar Peralta et al. (2007) avaliou 124 pacientes com insuficiência venosacrônica (CEAP C0–C3) tratados por oito semanas com uma combinação a espécie botânica de VENOLIN®, hesperidina metilchalcona e vitamina C. Os resultados mostraram redução rápida e significativa dos sintomas: dor (79% para 20%), sensação de peso (85% para 12%), cãibras (74% para 8%) e edema (82% para 14%) já na segunda semana, com remissão total ao final do tratamento.

