

CUREIT®

Controle a inflamação crônica silenciosa e invista na sua longevidade

O QUE É?

É uma formulação patenteada de curcumina biodisponível e altamente bioeficiente, obtida a partir do extrato do rizoma de Curcuma longa com teor total de curcuminoides entre 45% e 50%.



BENEFÍCIOS

- Redução significativa da dor e rigidez articular.
- Ação antiaging celular e cutânea (melhora na hidratação, viscoelasticidade e rugas).
- Manutenção e proteção cognitiva, hepática (hepatoprotetor) e cardiovascular.

INDICAÇÃO

- Doenças crônicas inflamatórias e autoimunes.
- Síndrome metabólica (resistência insulínica, dislipidemia, inflamação crônica de baixo grau).
- Prevenção do envelhecimento precoce (antiaging).

COMO ATUA?

- Bloqueia a ativação do fator de transcrição NF-κB (Nuclear Factor kappa B), inibindo a transcrição de citocinas inflamatórias (como TNF) induzidas por múltiplos estímulos.
- Apresenta atividade inibitória dose-dependente sobre a enzima hialuronidase, auxiliando na preservação da elastoviscosidade do ácido hialurônico na matriz extracelular (pele e líquido sinovial).

FÓRMULAS SUGERIDAS

Manutenção e Reparo das Articulações

Cureit®.....250mg
HA Powder.....75mg
DiluCap Hygro.....qsp 1 cápsula vegetal

Tomar 1 dose 2 vezes ao dia.

Apoio à doenças autoimunes

Cureit.....250mg
Vitamina D3.....2000UI
Vitamina B6.....200mg
DiluCap Hygro.....1 cápsula vegetal

Tomar 1 dose ao dia.

POSOLOGIA SUGERIDA

- Uso oral. 25 – 500 mg ao dia.

ESTUDO CLÍNICO

Estudo Clínico em Artrite Reumatoide:

- Desenho: Ensaio clínico piloto, randomizado, duplo-cego e controlado por placebo, conduzido por 3 meses com 36 pacientes com artrite reumatoide ativa.
- Grupos: Dose baixa (250 mg, 2x/dia), Dose alta (500 mg, 2x/dia) e Placebo (500 mg de amido).

Resultados:

- Redução substancial na atividade da doença (DAS28): queda de 62% (dose 250 mg) e 72% (dose 500 mg).
- Alívio da dor (Escala Visual Analógica - VAS): redução de 62% (250 mg) e 72% (500 mg).
- Redução nos níveis de Proteína C-Reativa (PCR): queda de 30% (250 mg) e 51% (500 mg).
- Redução nos níveis de Fator Reumatoide (FR): queda de 80% (250 mg) e 84% (500 mg).
- Boa tolerabilidade e segurança, sem alterações adversas nos parâmetros bioquímicos basais.

