
curante.
Farmácia de Manipulação

BIOINTESTIL®



EQUILÍBRIO DA MICROBIOTA COM ENTREGA DIRETA ONDE O ORGANISMO MAIS PRECISA.

O QUE É?

O BIOintestil® é um produto natural patenteado (Patente Europeia n.º 16171535.4-1466), desenvolvido pelo Departamento de Medicina Clínica da Universidade de Bolonha, na Itália, voltado para a saúde gastrointestinal. Sua formulação combina o óleo essencial de Cymbopogon martinii (padronizado em geraniol) absorvido homogeneamente na fibra em pó do rizoma de Zingiber officinale (gengibre, padronizado em 6-gingerol).

BENEFÍCIOS

- Equilíbrio do microbioma
- Certificação e segurança biológica
- Liberação direcionada no cólon
- Ação antimicrobiana seletiva
- Ação anti-inflamatória específica
- Estimulação imunitária fisiológica

INDICAÇÃO

- Dores, cólicas e distensão/inchaço abdominal.
- Regularização do trânsito e motilidade intestinal desregulada.
- Controlo e tratamento da disbiose intestinal.
- Alívio do excesso de gases intestinais e flatulência.
- Quadros de náuseas, vómitos, refluxo e má digestão.

COMO ATUA?

Ação anti-inflamatória: O geraniol inibe a expressão da COX-2 e do NF-κB, diminuindo citocinas pró-inflamatórias como TNF-α e IL-17. O 6-gingerol atua sobre a COX-2 e a lipoxigenase, reduzindo mediadores como leucotrienos, prostaglandina 2 e tromboxano B2, além de elevar prostaciclinas sem aumentar prostaglandina E.

FÓRMULAS SUGERIDAS

Protocolo de Manutenção e Equilíbrio da Microbiota

BIOintestil® ..... 600 mg
Excipiente q.s.p. ..... 1 dose
Cápsula gastrorresistente.

Tomar 1 dose ao dia, preferencialmente antes de uma refeição principal.

Fórmula Eixo Intestino-Cérebro

BIOintestil® ..... 300 mg
L-Teanina ..... 100 mg
Extrato seco de Camomila ..... 150 mg

Tomar 1 dose, 2 vezes ao dia (manhã e final da tarde)

POSOLOGIA SUGERIDA

Uso contínuo (manutenção): 600 mg ao dia.

ESTUDO CLÍNICO

- Estudo conduzido com 19 pacientes com SII que receberam 600 mg de BIOintestil®, 3 vezes ao dia, por 4 semanas.
- 63% dos pacientes apresentaram melhora clínica significativa a partir da 2ª semana, efeito sustentado até o fim do tratamento.
- 81% dos participantes normalizaram a regularidade e função intestinal, e 68% tiveram redução importante na intensidade da dor.
- Redução significativa no escore de gravidade IBS-VAS ($p < 0,05$) e redução sérica da quimiocina inflamatória MIP-1β.
- As análises metagenômicas demonstraram reequilíbrio da proporção entre Bacteroidetes e Firmicutes (aproximando da faixa saudável de 1:1, especialmente nos subtipos SII-M e SII-D) e elevação do filo Actinobacteria. Nenhum efeito adverso relevante foi registrado.

FARMÁCIA MAGISTRAL
curante.
Farmácia de Manipulação

farmaciacurante
atendimento@curante.com.br
(61) 99974-9614

Quer saber mais?
Acesse nosso site e fale com nossa equipe de vendas.